

## Рекомендации пациенту после протезирования несъемными ортопедическими конструкциями

Уважаемый пациент! Вам было проведено ортопедическое лечение.

Ортопедическая коронка или протез - это высокотехнологичная конструкция, которая помогает восстановить функцию жевания, речи и эстетику зубных рядов!

Процесс привыкания к ортопедической конструкции индивидуальный, но, как правило, длится около двух недель. В этот период у Вас могут возникать различные временные ощущения (отсутствие четкости речи, потеря вкусовых ощущений, затрудненное откусывание и разжевывания пищи). Через некоторое время конструкция практически перестает ощущаться в полости рта.

Важно понимать, что зубы, покрытые ортопедической конструкцией, требуют особенно тщательного ухода.

### Мы рекомендуем Вам соблюдать некоторые правила:

- Несъемные зубные конструкции необходимо чистить зубной щеткой с пастой так же, как собственные зубы, два раза в день.
- После каждого приема пищи прополощите полость рта для удаления остатков пищи. Особенно важно удалять зубной налет и остатки пищи из межзубных промежутков и участков, где искусственный зуб контактирует с деснами. В этом Вам помогут дополнительные средства гигиены: ершики для межзубных промежутков, монопучковая щетка, ирригатор для полости рта. Ваш врач поможет подобрать индивидуальные средства гигиены.
- Поддерживать здоровье десен и зубов, а также своевременно выявить возможные проблемы на ранней стадии помогут регулярная профессиональная гигиена полости рта не реже 1-го раза в 6 месяцев.
- Ортопедические конструкции из современных материалов прочны и долговечны. Для того, чтобы результат радовал Вас как можно дольше, мы рекомендуем ограничить накусывание искусственными зубами твердой пищи (сухари, кости и т.д.) и избавиться от вредных привычек (кусание ручек, карандашей, употребление семечек, орехов, открывания зубами бутылок и т.п.).
- Если коронка или протез зафиксирован на временный цемент, не рекомендуется жевать жевательную резинку и другие вязкие пищевые продукты, чтобы преждевременно не нарушить фиксацию.

### Как можно скорее обратитесь в клинику в следующих случаях:

- при расцементировке временной или постоянной коронки (протеза), зафиксированной на временный цемент;

- при нарушении фиксации коронки (протеза), зафиксированной на постоянный цемент. Признаками нарушения фиксации могут быть «люфт» конструкции, неприятный запах изо рта;
- если произошел скол облицовочного материала коронки или несъемного зубного протеза (керамика, композит, пластмасса);
- при появлении подвижности коронки (протеза), зафиксированных на имплантате;
- при появлении неприятных ощущений в области искусственной конструкции;
- если коронка (протез) вызывает у вас дискомфорт.

### Стоматология SKYCLINIC

Внимание! В случае необходимости консультации Вы можете обратиться к нам по адресу и телефону: стоматология SKYCLINIC, ул. Нивская 4-Г, (068) 270 20 20

Желаем Вам крепкого здоровья!